

Dénomination du médicament

**ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée**  
**Nitrate d'éconazole**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application ?
3. Comment utiliser ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : ANTIFONGIQUE A USAGE TOPIQUE, DERIVES  
IMIDAZOLES ET TRIAZOLES - code ATC : D01AC03

Ce médicament contient un antifongique (actif contre les champignons) de la famille des imidazolés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines mycoses de la peau (affections cutanées dues à des champignons).

**Candidoses :**

- Traitement des mycoses des plis macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, interdigital.

Concernant les infections des plis de l'aîne, un traitement antifongique par voie orale est nécessaire pour traiter un éventuel foyer digestif et/ou vaginal, et ainsi éviter toute récurrence.

**Dermatophyties :**

- Traitement :
  - Intertrigo macéré génital et crural.
  - Intertrigo des orteils.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ?**

**N'utilisez jamais ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée :**

- si vous êtes allergique au nitrate d'éconazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée.

USAGE EXTERNE UNIQUEMENT.

Faites attention avec ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée :

- chez l'enfant,
- sur une grande surface de peau,
- sur une peau lésée (abîmée),
- dans les situations où le phénomène d'occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, lésions sous-mammaires).

Dans ces cas, il est impératif de respecter les recommandations et la posologie indiquée dans la notice car le médicament pénètre plus facilement dans la peau.

- Vous devez arrêter d'utiliser ce médicament si une allergie (reconnaisable par des rougeurs, des boutons ) ou une irritation apparaissent.
- Ne pas appliquer dans l'œil, le nez ou en général sur des muqueuses.
- Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du Candida).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Prévenez votre médecin si vous prenez un médicament pour fluidifier le sang, les antivitamines K (comme acénocoumarol, fluindione, warfarine) car ECONAZOLE MYLAN peut modifier l'action des antivitamines K chez certaines personnes. Par conséquent, vous devrez surveiller fréquemment l'INR (examens sanguins). Selon votre situation, votre médecin peut également décider de modifier la dose de votre antivitamine K pendant ou après le traitement par ECONAZOLE MYLAN.

### **ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Compte tenu d'un passage systémique limité mais possible après application par voie cutanée et du recul clinique, l'utilisation d'ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée n'est pas recommandée au cours de la grossesse ou de l'allaitement, sans l'avis de votre médecin.

Ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée contient**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### **Posologie**

Appliquer ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée sur la peau 2 à 3 fois par jour, sans dépasser 3 applications par jour. Le traitement doit être poursuivi pendant 2 à 4

semaines.

### **Mode d'administration**

Pour USAGE EXTERNE UNIQUEMENT : il s'applique directement sur la peau.

Nettoyez la zone atteinte ainsi que son contour, puis séchez bien la peau avant l'application.

L'utilisation régulière de ce médicament pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

**En cas de non amélioration, consultez un médecin.**

**Si vous avez respiré ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée accidentellement :**

Consultez rapidement le médecin car le talc contenu dans la poudre pourrait bloquer votre respiration (particulièrement chez les nourrissons et les enfants).

**Si vous avez avalé ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée accidentellement :**

Consultez le médecin afin qu'il vous prescrive un traitement adapté aux effets indésirables qui peuvent survenir suite à cette ingestion.

**Si vous avez accidentellement projeté ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée dans les yeux :**

Lavez à l'eau claire ou avec une solution saline.

Si cela ne suffit pas, consultez un médecin.

**Si vous avez utilisé plus d'ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre d'utiliser ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée :**  
Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Les effets indésirables fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 100) sont :**

- des démangeaisons,
- une sensation de brûlure,
- une douleur au site d'application.

**Les effets indésirables peu fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 1 000) sont :**

- des rougeurs,
- un inconfort,
- un gonflement au site d'application.

**Les effets indésirables dont la fréquence n'est pas déterminée sont :**

- une allergie (hypersensibilité),
- un gonflement de la gorge ou du visage (angioœdème),
- une éruption sur la peau,
- une urticaire,
- des cloques,
- la peau qui pèle (exfoliation).

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C, à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

## **Ce que contient ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée**

- La substance active est :

nitrate d'éconazole..... 1 g  
pour 100 g de poudre pour application cutanée.

- Les autres composants sont :

talc, silice colloïdale anhydre (AEROSIL 300), oxyde de zinc léger.

## **Qu'est-ce que ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour application cutanée. 30 g de poudre en flacon poudreux.

## **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

### **MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

## **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

### **MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

## **Fabricant**

### **MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

ou

### **LABORATOIRES CHEMINEAU**

93 ROUTE DE MONNAIE  
37210 VOUVRAY

## **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

## **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).